


Le CERN et le LHC



Le CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) 1952


- Devient en 1954: l'Organisation Européenne pour la recherche nucléaire: installée à Genève, pas de recherche militaire, les résultats sont publics
 - Missions:
 - recherche:** questions concernant l'Univers
 - technologie:** faire reculer les limites
 - collaboration:** rassembler les nations autour de la science
 - éducation:** formation des scientifiques
 - Conseil du CERN (assisté du Conseil des initiatives scientifiques et du conseil des finances) : 2 délégués et 1 voix par état, décisions à la majorité simple. Le directeur général (actuellement: R. Heuer) nommé pour 5 ans par le Conseil.



1954-2014 : le CERN a 60 ans !

- Evénements organisés par le CERN pour commémorer deux dates clefs
1^{er} juillet 1953 : accord à l'Unesco (Paris) entre les 12 états fondateurs du CERN sur la convention créant ce nouveau laboratoire
29 septembre 1954 : ratification de ladite convention – le CERN est né !
- Autres événements organisés tout au long de l'année par les pays membres
dont la France : soyez à l'écoute des médias !

Site internet du CERN dédié à cet anniversaire : <http://cern60.web.cern.ch/fr>



YEARS/ANS **CERN**

Participants au CERN

- 21 états membres (votent au Conseil, contribuent au budget : accélérateurs, fonctionnement : 2400 personnes, ~ 1 milliard d'Euros)

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, Israël, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas,
la Pologne, le Portugal, la République slovaque,
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède
et la Suisse.

- observateurs (assistent aux réunions du Conseil)

Commission européenne, l'Inde, Israël, le Japon, la Fédération de Russie,
la Turquie, l'UNESCO et les États-Unis d'Amérique

- états non-membres (participent aux expériences)

une trentaine d'états

- les physiciens, ingénieurs, techniciens assurent la construction et l'exploitation des expériences (le CERN a une contribution minoritaire dans les expériences ~15-20%)




10 000 visiteurs

608 instituts, 113 nationalités

Grandes dates : le fil conducteur

- ▶ Découvrir des particules toujours plus lourdes
- ▶ Des interactions toujours plus subtiles (=rares !)



- Construire des accélérateurs toujours plus puissants ($E \uparrow$) et toujours plus intenses (collisions par seconde \uparrow)
- Construire des détecteurs de plus en plus sophistiqués.
- Acquérir et analyser toujours plus de données.

Les grandes dates du CERN

1954

création du CERN

1957

1^{er} accélérateur (SC) à 0,6 GeV
fonctionne jusqu'en 1990

1959

démarrage du PS
protons à 28 GeV



le synchrocyclotron (SC)

vue du CERN en 1964



le Proton Synchrotron (PS)


Les grandes dates du CERN

1971

ISR : premier collisionneur pp au monde.


1973

Découverte des “courants neutres” : unification de l’électromagnétisme et de la force faible.



la chambre à bulles Gargamelle

photo de la réaction $\bar{\nu}_\mu e \rightarrow \bar{\nu}_\mu e$



A. Lagarrigue (1924-1975)

Expérience Gargamelle (1973)

Les grandes dates du CERN

1976

Le SPS: collisionneur de protons à 450 GeV,
reconverti à partir de 1979 en collisionneur p- \bar{p}




1983

Les expériences UA1 et UA2 y découvrent
les particules médiatrices de la force faible: W^\pm et Z^0

1985

Prix Nobel de physique à
C. Rubbia et S. Van der Meer



UA1




UA2

Les grandes dates du CERN


1970's

Saut technologique : G. Charpak invente la chambre à fils.




Les grandes dates du CERN

Avant : Analyse de clichés




1960 , interactions de protons du PS avec de l'hydrogène

Après : reconstruction électronique et informatique des collisions



Ère manuelle



Ère électronique
(1000 fois plus rapide)

Les grandes dates du CERN

1989

Démarrage du LEP : collisionneur électron-positron, 50 GeV.
Creusement du tunnel de 27 km débuté en 1985.
4 expériences étudient pendant 7 ans les propriétés du Z^0 .
De 1996 à novembre 2000 l'énergie des faisceaux du LEP est montée
à 100 GeV (étude détaillée de la force faible)



1990


La gestion des données
prend un nouvel essor:
→ Invention du Web par
T. Berners-Lee



Les grandes dates du CERN

1990's

Des technologies de mieux en mieux maîtrisées pour contrôler aussi des particules de basse énergie.



L'anneau LEAR d'antiprotons à basse énergie



1995

premiers atomes (9)
d'anti-hydrogène

2002

des milliers d'atomes
d'anti-hydrogène.

Les grandes dates : Le LHC ! (2008)



CMS

Aéroport de
Genève



ATLAS




ALICE




LHCb

Pourquoi le LHC ? Quelles raisons théoriques ?

Mécanisme de Higgs : confère une masse aux particules élémentaires.



Peter Higgs “devant” le mécanisme “de Higgs”



Au moins une nouvelle particule:
Le boson de Higgs



Certains calculs deviennent infinis
à très haute énergie

- Théorie actuelle incomplète
- Nouvelles théories

matière noire?



La découverte d'un boson (de Higgs ?) au LHC



La découverte d'un nouveau boson au LHC

- Il s'agit maintenant de confirmer qu'il s'agit bien du boson de Higgs
 - Etude des propriétés de la particule
- Un moment très important dans l'histoire du LHC
- Un ingrédient fondamental dans la compréhension de notre Univers

La conception du LHC

Construit dans le tunnel de 27 km occupé avant par le LEP, ~5 Milliards d'Euros.




Consommation électrique: 120 MW
(équivalente à celle d'une ville
de 150 000 habitants)

Conçu dans les années 1980,
approuvé en 1994, sa
construction débute en 1998.


Collisionneur proton-proton de 7 TeV,
supraconducteur
(-271,3°C, **plus froid que le vide spatial**)
très intense
(600 millions de collisions par seconde)



Fonctionnement du LHC : la chaîne d'accélération






Les différents accélérateurs du CERN sont utilisés pour accélérer et injecter les protons dans le LHC.



Il faut guider et accélérer les protons.


Champ magnétique

Guidage



Les particules suivent une orbite circulaire, mais ne gagnent pas d'énergie

Accélération



Les particules chargées positivement (●) proche de la crête de l'onde EM sont soumises à une plus grande force vers l'avant. Celles situées près du centre une moins grande force. Le résultat est que les particules tendent à se déplacer en même temps que l'onde.

Champ électrique



Les particules gagnent 16 MeV par passage (11000 tours par seconde)

Le faisceau du LHC

Actuellement, fait de ~1400 paquets contenant chacun 100 milliards de protons.
Chaque paquet est séparé de ses voisins immédiats par au moins 7 m.



Aimants focalisant les faisceaux
au voisinage des points de collision

Énergie d'une collision (2012) :

4 TeV + 4 TeV $\sim 1.3 \times 10^{-6}$ J

sur une surface infime 10^{-30}m^2

$\sim 10^{24} \text{ J/m}^2$: considérable


Énergie totale des faisceaux :

4 TeV x N(protons) ~ 400 millions de Joules ~ 1 TGV à 150 km/h

L'énergie des faisceaux augmentera jusqu'à ~ 7 TeV à partir de 2015.

paquets : quelques cm de long
transversalement \sim mm

taille transverse au point de collision
(expériences) : $16 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$
 \sim diamètre d'un cheveu




Croisement des faisceaux à un point de collisions

Le LHC en chiffres

- La plus grande machine du monde (9300 aimants, 10000t d'azote, 120t d'He)
→ le plus grand frigo de la planète
- Les protons effectuent 11245 tours de la machine par seconde (vitesse ~ 99.999993% c)
- Vide très poussé à l'intérieur de la chambre à vide (10^{-13} atm)
→ 1/10 de la pression sur la lune
- On y trouve les points les plus “chauds” (100000 fois la température interne du soleil) dans un espace minuscule et dans un anneau plus froid que le vide sidéral (-271.3°C)



ligne cryogénique avant la pose des aimants



chambre à vide du LHC (en coupe)



Les apports pour la société

Les découvertes en sciences fondamentales permettent les grandes avancées


- Les transistors ont été inventés parce qu'on avait découvert la mécanique quantique
- Le système de positionnement GPS utilise la relativité générale

La recherche a des besoins spécifiques : elle développe de nouvelles technologies

- Le “world wide web” inventé au CERN
- Actuellement, plus de 7000 physiciens analysent les données du LHC.
Elles représentent l'équivalent d'une pile de CD de 20 km de hauteur chaque année.
De nouveaux moyens de stockage et de calcul ont donc été mis au point pour les traiter :
→ la grille de calcul
- L'imagerie médicale utilise les technologies de détection de la physique des particules.



Système de tomographie à émission de positons



“ferme” de PC au CERN (2006)